


## **VIH/SIDA ENTRE LATINOS EN AL DISTRITO DE COLUMBIA**


Al 31 de diciembre de 2009 había 16,721 residentes del Distrito de Columbia viviendo con VIH/SIDA. De esos, 912 eran Latinos. Esto representa el 2% de los Latinos que viven en el Distrito.

**Gráfica 1: Latinos viviendo con VIH/SIDA: Casos per Sexo**




Más del 80% de los casos entre Latinos son entre hombres (Gráfica 1). El 68% de los casos fueron diagnosticados en hombres entre las edades de 20 y 39 años (Gráfica 2). Al 31 de diciembre de 2009, 64% de los casos fueron en hombres entre las edades de 30 y 49 años (Gráfica 3). Sin embargo, los Latinos que viven con VIH/SIDA en el Distrito son más jóvenes que los negros y blancos no-Latinos que viven con VIH/SIDA en el Distrito. El 68% de los negros y blancos no-Latinos que viven con VIH/SIDA tenían entre 30 y 49 años al 31 de diciembre de 2009.

**Gráfica 2. Latinos viviendo con VIH/SIDA: Edad al ser diagnosticados**



**Gráfica 3. Latinos viviendo con VIH/SIDA: Casos por edad**




Más de la mitad de los casos de VIH/SIDA son entre hombres que se infectaron a través de relaciones sexuales con otros hombres (MSM) y una cuarta parte fueron infectados a través de contacto heterosexual (Gráfica 4). Entre los hombres Latinos que viven con VIH/SIDA, 62% se infectaron a través de sexo con otros hombres y 17% se infectaron por contacto heterosexual.


**Para información sobre la prueba de VIH visite [DCTakesOnHIV.com](http://DCTakesOnHIV.com) - llame al 311, o mande texto "DCTEST" al 61827.**

Entre las mujeres Latinas, el 68% fueron infectadas a través de relaciones heterosexuales y para 19% el comportamiento de riesgo no ha sido identificado (RNI) (Figure 5).

Gráfica 4. Latinos viviendo con VIH/SIDA: Casos por modo de transmisión




Gráfica 5. Modo de transmisión de VIH entre Latinos: Casos por sexo



Entre el 2005 y el 2009 se diagnosticaron 292 casos de VIH/SIDA entre los residentes Latinas del Distrito (Gráfica 6). El número más alto de nuevos diagnósticos de VIH/SIDA entre Latinos fue 73 casos en el 2007. En el 2009 sólo se diagnosticaron 45 casos entre Latinos. Esta reducción en nuevos casos entre Latinos refleja una tendencia general a la reducción de nuevos

diagnósticos de VIH/SIDA en el Distrito.

Gráfica 6. Nuevos casos de VIH/SIDA entre Latinos



El Departamento de salud rutinariamente mide la proporción de casos de SIDA cuyo diagnóstico de VIH tuvo lugar dentro de los 12 meses antes del diagnóstico de SIDA. Estos casos se conocen como "pruebas tardías." Entre los Latinos, el 64% de los casos de SIDA tuvieron pruebas tardías. Esto representa una disparidad de salud emergente y el Departamento de salud desarrollará o identificará intervenciones dirigidas a atender las necesidades únicas de los Latinos en DC.

**¿Esta información te fue útil?**

Para solicitar copias de esta publicación llame a la Administración de VIH/SIDA, Hepatitis, STD y TB (HAHSTA) al (202) 671-4900 o visite [www.doh.dc.gov/hahsta](http://www.doh.dc.gov/hahsta)

